

林寶華醫師治療妥瑞氏症依 YGTSS 耶魯抽動症整體嚴重程度量表評分記錄 - 2010 年編

A.本診所妥瑞病例編號：                      B.性別（男1、女2）：                      C.初診年齡（初診年 — 出生年）：                      歲

D.治療前評分(初診)日期：    年    月    日                      E.治療後評分(最後診次)日期：    年    月    日

F.病程史（初診年月 — 初發作年月）：    年    月.

G.觀察期（最後診日 — 初診日）：    年    月.

H.治療日數（統計初診至最後診次前1日之取服中藥日數）：                      日.

I.服中藥併服西藥日數：                      日

1、 運動 型抽 動	1.1 數量	無抽動：0分	單一抽動：1分	不同形式抽動 2~5種：2分	不同形式抽動 >5種：3分	多種抽動伴1種系列抽動：4分	多種抽動伴2種或更多系列抽動：5分	評分小計
	1.1.1 治療前評分							
	1.1.2 治療後評分							
	1.2 頻率	無抽動：0分	極少發生(不是每天發生)：1分	偶爾發生但不持續：2分	頻繁(每天發生,但可有<3小時停歇)：3分	經常(醒後每小時都發生)：4分	持續性(間歇不超過5~10分鐘)：5分	
	1.2.1 治療前評分							
	1.2.2 治療後評分							
	1.3 強度	無抽動：0分	不易覺察的輕微抽動：1分	比正常動作稍強的抽動：2分	比正常略強但未超過正常最大程度：3分	強度明顯超過正常行為：4分	抽動極強,引人注目甚至自傷：5分	
	1.3.1 治療前評分							
	1.3.2 治療後評分							
	1.4 複雜性	無抽動：0分	可疑有抽動：1分	輕度抽動：2分	中度(動作複雜或呈系列抽動)：3分	十分複雜、極易察覺：4分	長程的複雜抽動：5分	
1.4.1 治療前評分								
1.4.2 治療後評分								



## (二)耶魯抽動症整體嚴重程度 (YGTSS) 判斷和療效評定

### 1. YGTSS 整體嚴重程度判斷評分爲三級：

(1)輕度：<25 分。(2)中度：25~50 分。(3)重度：>50 分。

### 2. YGTSS 療效評定：

臨床總療效按完全緩解、顯效、有效、無效四級評定。

療效減分率 =  $1 - (\text{療後評分} / \text{療前評分} \times 100\%)$ 。

(1)痊癒：完全緩解，症狀消失，減分率 $\geq 95.00\%$ 。

(2)顯效：症狀大部消失，減分率 $\geq 66\%$ ,<95%。

(3)有效：症狀減輕，減分率 $\geq 33\%$ ,<66%。

(4)無效：症狀無變化，減分率<33%。

(5)總有效率：(完全緩解數+顯效數+有效數) \*100%。

## (三) Yale Global Tic Severity Scale

*Yale Child Study Center*

1992 版

<http://dcf.psychiatry.ufl.edu/files/2011/06/TIC-YGTSS-Clinician.pdf>